

ZASADY KWALIFIKACJI DO PORODU POZASZPITALNEGO

1. PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE DO PORODU POZASZPITALNEGO

- GDM1, GDM2;
- PIH;
- cholestaza ciężarnych;
- stan po leczeniu niepłodności (obecna ciąża w wyniku terapii hormonalnej, zapłodnienia pozaustrojowego);
- choroby przewlekłe;
- choroby i wady serca;
- astma oskrzelowa;
- infekcja dróg moczowych (potwierdzona posiewem moczu) w III trymestrze ciąży;
- infekcja w organizmie z gorączką potwierdzona badaniami laboratoryjnymi (CRP, morfologia z rozmazem) w III trymestrze ciąży;
- nawracające, liczne infekcje w przebiegu ciąży;
- niedoczynność lub nadczynność tarczycy leczona farmakologicznie;
- czynna depresja lub inne choroby psychiczne;
- uzależnienia (narkotyki , alkohol, papierosy w ciąży);
- HCV (+);
- HIV (+);
- WR (+);
- CMV IgM (+);
- Toxoplazmoza IgM (+);
- HBS (+);
- położenie miednicowe płodu;
- położenie poprzeczne i/lub skośne płodu;
- ciąża mnoga;
- poród przed ukończeniem 37 tyg. ciąży;
- poród po ukończeniu 42 tyg. ciąży;
- nieprawidłowa lokalizacja łożyska;
- hypotrofia płodu;
- makrosomia płodu;
- małowodzie (AFI poniżej 5);
- wielowodzie (AFI powyżej 20);
- nieprawidłowe przebiegi w badaniu USG;
- nieprawidłowa budowa miednicy kostnej ciężarnej;
- głęboka niedokrwistość ciężarnej;
- małopłytkowość (PLT poniżej 130 tys.);
- nieprawidłowe zapisy KTG;
- stan po cięciu cesarskim.

2. PRZECIWWSKAZANIA WZGLĘDNE DO PORODU POZASZPITALNEGO

- kolonizacja dróg rodnych *Streptococcus Agalactiae*;
- nieleczone, aktywne infekcje pochwy;
- stan po łyżeczkowaniu jamy macicy - należy wziąć pod uwagę przyczynę łyżeczkowania, przebieg zabiegu, ewentualne wystąpienie krwotoku z dróg rodnych, czy łyżeczkowania były związane z ciążą, poronieniem, powikłaniami III i/lub IV okresu porodu. Te ostatnie traktowane powinny być najostrożniej;
- wieloletnia antykoncepcja hormonalna lub wkładka domaciczna usunięta na krótko przed bieżącą ciążą;
- mięśniaki macicy - konieczna kontrola wielkości mięśniaków w badaniu USG, dokładny wywiad (krwotoczność miesiączek, zwiększone krwawienie z dróg rodnych po poprzednich porodach);
- ciężarna niepełnoletnia (konieczna pisemna zgoda prawnego opiekuna na odbycie porodu poza szpitalem dołączona do dokumentacji medycznej);
- małopłytkowość (PLT 130-150 tys.); poród poza szpitalem możliwy tylko przy prawidłowym koagulogramie;
- obciążony wywiad położniczy.